



Istituto Comprensivo Statale "F. Meloni"
Via Cagliari, 104 - 09015 Domusnovas (SU)
C.M. CAIC875002 - C.F. 90027700922 - tel. 0781/70786 - Fax 0781/729142
e-mail caic875002@istruzione.it - caic875002@pec.istruzione.it



Domusnovas, 4 febbraio 2026

Circolare n. 326

Al personale docente e ATA
Agli alunni e alle alunne
Alle famiglie
Scuola Primaria Villamassargia
Al sito web
e p.c. Alla DSGA

Oggetto: segnalazione di un possibile caso di parotite - nota informativa ASL

A séguito della segnalazione di un possibile caso di parotite di un minore nella scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo "Fernando Meloni" plesso di Villamassargia, si invita a prendere visione della nota informativa ASL in allegato.

Per qualsiasi informazione telefonare alla ASL - Ufficio Igiene Pubblica al numero: 0781.6683904 (il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00) o mandare una mail all'indirizzo: igienepubblica.carbonia@aslsulcis.it

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Marta Putzulu)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del. D.Lvo n. 39/1993)

Al Dirigente scolastico

Ai docenti

Alle famiglie degli alunni

OGGETTO: comunicazione informativa/formativa in materia di profilassi della parotite.

La **parotite**, comunemente chiamata “orecchioni”, è una malattia virale acuta che si manifesta nella maggior parte dei casi con ingrossamento e dolore delle ghiandole salivari, soprattutto della parotide (talora ghiandole sublinguali o sottomascellari), da uno o da entrambi i lati.

La tumefazione generalmente si risolve in 7-9 giorni.

I sintomi iniziali sono rappresentati da tumefazione delle ghiandole parotidi con conseguente dolore durante la masticazione e la deglutizione, febbre, malessere, spesso vomito, senso di prostrazione.

L'importanza di questa malattia deriva dalle sue possibili anche se rare **complicanze: meningoencefalite, deficit uditivi neuro sensoriali, pancreatite, orchite (se contratta dopo la pubertà).**

La **trasmissione** avviene per via aerea tramite goccioline respiratorie diffuse dal malato con tosse o starnuti o per contatto diretto con le secrezioni nasofaringee di una persona infetta o indirettamente attraverso oggetti contaminati con le secrezioni stesse. Una pregressa infezione conferisce immunità permanente.

Il **periodo più contagioso** varia da 6 a 7 giorni prima e fino a 9 giorni dopo la comparsa della tumefazione delle ghiandole salivari. L'infettività è massima nei 2 giorni precedenti e nei 4 giorni successivi la comparsa dei segni clinici della malattia. Possono essere contagiose anche le forme inapparenti.

Il **periodo di incubazione** varia dai 12 ai 18 giorni (range 14-25 giorni).

Il **rischio di diffusione nella scuola** è **medio/alto nei soggetti non vaccinati**. L'infezione è tipica dell'età scolare ed è più frequente nel periodo inverno-primavera.

Le misure preventive per limitare la diffusione della malattia sono le seguenti:

- Per i **soggetti affetti da parotite**: isolamento domiciliare (in camera privata) e, in caso di ricovero ospedaliero. Isolamento respiratorio per 9 giorni dalla comparsa della tumefazione delle ghiandole salivari. NB: pertanto il bambino deve essere allontanato dalla comunità fino a 9 giorni dalla comparsa della tumefazione delle ghiandole parotidi, periodo durante il quale può essere eliminato il virus.
- Per i **contatti della persona affetta da parotite (compagni di classe, familiari e contatti stretti)**:
 - sorveglianza sanitaria e verifica dei bambini (e adulti) non ancora vaccinati ai quali va proposta la vaccinazione; per i soggetti suscettibili (mai vaccinati o che non hanno mai avuto la malattia) si prevede la restrizione della frequenza di collettività dal 12° al 25° giorno successivo all'esposizione.Tuttavia la vaccinazione antiparotite potrebbe non essere in grado di prevenire la comparsa della malattia dopo l'esposizione al caso, cioè se la malattia è già in incubazione!
Si ricorda che, come da Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV), il vaccino è offerto gratuitamente a tutti i bambini dall'età di 12-13 mesi e una seconda dose di richiamo ai 5/6

anni. È disponibile in formulazione trivalente (MPR) o tetravalente (morbillo-parotite-rosolia e varicella-MPRV).

Misure di igiene ambientale

Attenersi alle buone regole di pulizia, disinfezione e aerazione dei locali della scuola.

In caso di sintomi o dubbi si raccomanda di rivolgersi al medico curante portando in visione la presente informativa.

Inoltre, i genitori devono attenersi alle indicazioni del Pediatra o del Medico curante fino alla riammissione in comunità.

Cordiali saluti.

Il Servizio di Igiene Pubblica ASL Sulcis-Iglesiente.

Dott.ssa Alessandra Argiolas